



Acétazolamide Gélules vétérinaires

Date de création
08 Août 2019

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

Les informations fournies ne sont pas transposables aux animaux de rente.

1. QU'EST-CE QUE L'ACETAZOLAMIDE gélules vétérinaires ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Composition qualitative

Acétazolamide

Indications thérapeutiques

L'acétazolamide est utilisée :

- Chez le chien et le chat : traitement des glaucomes à angle fermé avec hyperproduction d'humeur aqueuse,
- Chez le cheval : traitement de la paralysie périodique hyperkaliémique.

L'utilisation chez le chat doit cependant être limitée du fait de la présence d'effets indésirables.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER L'ACETAZOLAMIDE gélules vétérinaires?

Contre-indications et précautions d'emploi

L'acétazolamide ne doit pas être utilisée en cas d'insuffisance hépatique, rénale, pulmonaire, adrénocorticale, d'hypokaliémie, d'acidose hyperchlorémique, de déséquilibres hydro-électrolytiques. L'acétazolamide ne devrait pas être utilisé en cas d'obstruction pulmonaire.

Des précautions doivent être prises si ce traitement est administré en cas d'acidose respiratoire sévère ou d'anomalies hématologiques préexistantes.

Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament vétérinaire à l'animal

L'acétazolamide ne doit pas être utilisé par des personnes hypersensibles.
Bien se laver les mains après manipulation.

En cas d'ingestion accidentelle, demander immédiatement l'avis d'un médecin et présenter la notice ou la boîte du médicament.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Il existe des possibilités de réactions croisées d'hypersensibilité entre l'acétazolamide et le furosémide et les sulfonamides antibactériens.

L'administration d'acétazolamide doit se faire avec prudence en cas de traitement concomitant par quinidine, antidépresseurs tricycliques, procaïnamide, salicylates, phénobarbital, digoxine, insuline, médicaments affectant le métabolisme du potassium.

Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'ACETAZOLAMIDE gélules vétérinaires?

Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de nourriture.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale. Administrez de préférence au moment d'un repas.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'ACETAZOLAMIDE gélules vétérinaires peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les animaux.

Les troubles suivants ont été le plus souvent rapportés : troubles gastro-intestinaux, hématologiques, rénaux, sédation, dépression, fatigue, excitation, déséquilibres du ionogramme sanguin, insuffisance hépatique, rash cutané, réactions d'hypersensibilité.

Si vous remarquez un quelconque effet indésirable, parlez-en rapidement à votre vétérinaire ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'ACETAZOLAMIDE gélules vétérinaires?

Modalités de conservation

Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Ne pas jeter dans les ordures ménagères : rapporter le surplus du traitement à votre vétérinaire ou pharmacien.

Péremption

3 mois.