



Diltiazem gélules vétérinaires

Date de création
21 Mai 2019

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LE DILTIAZEM gélules vétérinaires ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Composition qualitative

Diltiazem chlorhydrate

Indications thérapeutiques

Le DILTIAZEM gélules vétérinaires est indiqué chez le chien et le chat dans le traitement des arythmies supraventriculaires et l'hypertension

Chez le chat et le furet, le diltiazem est également utilisé dans la cardiomyopathie hypertrophique. Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE DILTIAZEM gélules vétérinaires?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué en cas de :

- Bloc auriculoventriculaire ou de syndrome de dysfonctionnement sinusal,
- Maladie rénale,
- Bradycardie sévère,
- Hypotension artérielle,
- Hypersensibilité à l'un des composants,
- Gestation ou d'allaitement.

Le traitement ne doit jamais être interrompu brutalement. D'une manière générale, le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de votre vétérinaire.

La fréquence cardiaque doit être vérifiée en début et en fin de traitement.

Il est nécessaire de renforcer la surveillance de l'animal en cas de d'insuffisance cardiaque congestive et/ou de diabète.

Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament vétérinaire à l'animal

Évitez le contact en cas d'hypersensibilité au diltiazem ou à l'un des composants (à défaut porter des gants).

DILTIAZEM gélules vétérinaires ne doit pas être manipulé par une femme enceinte ou allaitante.

Lavez-vous les mains immédiatement après contact.

Interrompez toute manipulation de DILTIAZEM gélules vétérinaires en cas d'apparition de signes d'irritation cutanée (démangeaison, éruption, rougeur...).

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ne pas utiliser avec les bêtabloquants, la digitaline ou la digoxine.

Renforcer la surveillance en cas d'administration concomitante d'anticonvulsivants, de ciclosporine, de propranolol, de médicaments antiacides tels que la cimétidine ou la ranitidine.

Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE DILTIAZEM gélules vétérinaires?

Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de nourriture.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale. Administrer de préférence au moment d'un repas.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, le DILTIAZEM gélules vétérinaires peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les animaux.

Les troubles suivants ont été le plus souvent rapportés :

- Léthargie temporaire à l'instauration du traitement,
- Troubles gastro-intestinaux : constipation, nausées, vomissements,
- Réactions cutanées,
- Dyspnée (difficulté à respirer),
- Hypotension,
- Amaigrissement.

Si vous remarquez un quelconque effet indésirable, parlez-en rapidement à votre vétérinaire ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE DILTIAZEM gélules vétérinaires?

Conditions de conservation

Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Péremption

3 mois.