



Diltiazem LP gélules vétérinaires

Date de création
15 Mai 2018

Version 3

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LE DILTIAZEM LP gélules vétérinaires ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Composition qualitative

Diltiazem chlorhydrate

Liste des excipients

Les gélules vétérinaires de *DILTIAZEM LP* sont des gélules de micro granules. En fonction de la spécialité utilisée pour réaliser la préparation, les excipients peuvent être différents. Pour de plus amples informations, rapprochez-vous de votre pharmacien.

Indications thérapeutiques

LE *DILTIAZEM LP gélules vétérinaires* est indiqué dans le traitement des cardiomyopathies hypertrophiques primitives.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE DILTIAZEM LP gélules vétérinaires?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué en cas de :

- Bloc auriculoventriculaire ou de syndrome de dysfonctionnement sinusal,
- Maladie rénale,
- Bradycardie sévère,
- Hypotension artérielle,
- Hypersensibilité à l'un des composants,
- Gestation ou d'allaitement.

Le traitement ne doit jamais être interrompu brutalement. D'une manière générale, le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de votre vétérinaire.

La fréquence cardiaque doit être vérifiée en début et en fin de traitement.

Il est nécessaire de renforcer la surveillance de l'animal en cas de d'insuffisance cardiaque congestive et/ou de diabète.

Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament vétérinaire à l'animal

Évitez le contact en cas d'hypersensibilité au diltiazem ou à l'un des composants (à défaut porter des gants).

DILTIAZEM LP gélules vétérinaires ne doit pas être manipulé par une femme enceinte ou allaitante.

Lavez-vous les mains immédiatement après contact.

Interrompez toute manipulation de *DILTIAZEM LP gélules vétérinaires* en cas d'apparition de signes d'irritation cutanée (démangeaison, éruption, rougeur...).

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ne pas utiliser avec les bêtabloquants, la digitaline ou la digoxine.

Renforcer la surveillance en cas d'administration concomitante d'anticonvulsifs, de ciclosporine, de propranolol, de médicaments antiacides tels que la cimétidine ou la ranitidine.

Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE DILTIAZEM LP gélules vétérinaires?

Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de nourriture.

Le diltiazem LP se présente sous forme de petites granules dites « gastro-résistantes ». Elles ne doivent pas être écrasées.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale. Administrer de préférence au moment d'un repas.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE DILTIAZEM LP gélules vétérinaires* peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les animaux.

Les troubles suivants ont été le plus souvent rapportés :

- Léthargie temporaire à l'instauration du traitement,
- Troubles gastro-intestinaux : constipation, nausées, vomissements,
- Réactions cutanées,
- Dyspnée (difficulté à respirer),
- Hypotension,
- Amaigrissement.

Si vous remarquez un quelconque effet indésirable, parlez-en rapidement à votre vétérinaire ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE DILTIAZEM LP gélules vétérinaires?

Conditions de conservation

Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Péremption

3 mois.