



## Ronidazole gélules vétérinaires gastro-résistantes

Date de création  
12 Décembre 2019

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

### 1. QU'EST-CE QUE *RONIDAZOLE gélules vétérinaires gastro-résistantes* ET DANS QUEL CAS EST-CE UTILISÉ ?

#### Composition qualitative

Ronidazole

#### Indications thérapeutiques

Le ronidazole est utilisé :

- Chez le chien : traitement de seconde intention des giardiases,
- Chez le chat : traitement des infestations à *Trichomonas foetus* et des giardiases,
- Chez le pigeon : traitement des infestations à *Trichomonas gallinae*.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER *RONIDAZOLE gélules vétérinaires gastro-résistantes* ?

#### Contre-indications et précautions d'emploi

Le ronidazole ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité au produit et/ou aux nitro-imidazolés.

Ne pas administrer aux animaux destinés à la consommation.

Ne pas administrer aux animaux allaitants. En cas de gestation, bien mesurer le rapport bénéfices-risques.

#### Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament vétérinaire à l'animal

Tout contact direct avec la peau doit être évité. Porter des vêtements de protection (gants et autres protections) pendant la manipulation du produit.

Lors d'aspersion accidentelle, la peau et les yeux doivent être lavés immédiatement et abondamment à l'eau. Se laver les mains après le traitement et avant tout repas.

Il est recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes hypersensibles aux nitro-imidazolés, de ne pas être en contact avec le ronidazole.

#### Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Le ronidazole doit être utilisé avec précaution en cas de traitement par cimétidine, ketoconazole, fluoro-uracile, lithium, oxytétracycline, phénobarbital, rifampicine, phénytoïne, warfarine.

Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou pharmacien.

### 3. COMMENT UTILISER *RONIDAZOLE gélules vétérinaires gastro-résistantes* ?

#### Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Les gélules ne doivent pas être ouvertes, l'enrobage des gélules étant gastro-résistant. Si l'administration de gélules chez l'animal est vraiment problématique, vous pouvez ouvrir la gélule et mélanger son contenu avec une petite quantité de nourriture.

Chez le chien et le chat, le ronidazole doit être préférentiellement administré avec de la nourriture pour réduire les effets indésirables gastro-intestinaux.

Sur demande, des arômes appétents peuvent être ajoutés aux gélules au moment de la fabrication.

#### Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Administrez de préférence au moment d'un repas lors d'un traitement chez le chien et / ou le chat.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, le *RONIDAZOLE gélules vétérinaires* peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les animaux.

Les troubles suivants ont été le plus souvent rapportés :

- neurotoxicité : toxicité réversible dès arrêt du traitement, similaire à celle induite par le métronidazole. Les symptômes peuvent être tremblements, léthargie, anorexie, nystagmus, convulsions, agitation ; les cas reportés sont avec des doses de 60mg/kg ou plus ;

- troubles gastro-intestinaux type anorexie, vomissements ;

- augmentation du risque de tumeurs mammaires bénignes ;

- augmentation du risque de tumeurs pulmonaires bénignes et / ou malignes.

Si vous remarquez un quelconque effet indésirable, parlez-en rapidement à votre vétérinaire ou pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER *RONIDAZOLE gélules vétérinaires gastro-résistantes* ?

#### Modalités de conservation

Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Ne pas jeter dans les ordures ménagères : rapporter le traitement excédentaire à votre pharmacien ou votre vétérinaire.

#### Péremption

3 mois.